

22 juin
1770


Par M^r. Mavriques.

Correspondant à Naples.

n^o 33.

I.

observation



plaie pénétrante dans la poitrine.

Le 19 janvier 1768, un soldat sans armes et sans défenses reçut un coup d'épée, au dessous de la mammelle gauche à environ deux travers de doigts du sternum, entre les cartilages de la cinquième et de la sixième vraies côtes. La plaie pénétrait dans la poitrine, et l'on jugea par l'étroitesse de cette plaie que la lésion du poulmon devoit être assez légère, l'épée n'étant pas entrée très profondément dans la capacité.

Comme cette blessure paroissoit être un vrai assassinat, le ministère public prit connoissance du delit et en conséquence d'une ordonnance du juge je visitai le blessé le second jour en présence du chirurgien qui l'avoit pansé. Je trouvai au malade un peu de fièvre et d'oppression, mais sans nulle espèce de crachement de sang: il avoit la faculté de

ARC 24 d. 32

se coucher librement sur les deux côtes, et l'oppression ne paroissoit augmenter lorsqu'il se mettoit sur celui, opposé à la blessure: néanmoins il se plaignoit d'une douleur assez vive dans la partie blessée, cette douleur fut attribuée avec assez de fondement à l'irritation de quelques parties nerveuses qui pouvoient avoir eu part à la lésion par l'extrémité de l'épée qui se trouva d'autant plus acérée que l'agresseur avant de porter le coup avoit été troué fendant contre les parois.

Après avoir rempli ma mission et fait mon rapport au juge, je ne vis plus le blessé; son chirurgien lui continua ses soins, et la plaie fut cicatrisée en peu de jours; cependant je m'informai soigneusement de son état, et j'appris que plusieurs accidents tels que la douleur de côté, la fièvre et l'oppression se manifestèrent quelques jours après d'une manière assez vive: Cette oppression ne l'empêcha pourtant pas encore de se coucher

quelques instans sur le côté opposé à la blessure, mais on observa qu'il ne pouvoit pas y demeurer aussi long tems qu'il le faisoit les premiers jours. Ces accidens obligèrent de faire plusieurs saignées, on en porta le nombre jusqu'à quatorze; on fit plusieurs consultations, on ne fut point invité, et on ne put y déterminer la nature des accidens s'il y avoit ou non, un épanchement dans le côté gauche de la poitrine: les doutes sur son existence se fortifièrent d'autant plus, que dans presque tout le tems de la maladie, le blessé malgré l'oppression s'est toujours tenu couché quelques momens sur le côté droit et s'est mis sur son flanc sans que ces symptômes aient paru augmenter: De sorte que n'ayant pas d'autres signes plus décisifs pour constater l'existence d'un épanchement dans le côté gauche de la poitrine, on n'osa entreprendre de faire l'opération



de l'empyème. On s'en tint donc aux saignées
comme je viens de le dire, à la diète et aux
remèdes adoucissants que l'on crut convenables.
Tel est le récit que me fit le chirurgien ordinaire
du malade et l'un des consultants qui le suivit
conjointement.

Environ le vingtième jour de la blessure
les signes de l'épanchement commencèrent à se
manifester d'une manière plus marquée; la
difficulté de se coucher sur le côté opposé à la
blessure, l'oppression ^{devenue} beaucoup plus forte que jamais
ne laissent presque plus de doute sur la
présence de l'épanchement, tous les avis parurent
se réunir en ce point; néanmoins on tarda encore
quelques jours à se décider de pratiquer l'opération
de l'empyème; pendant ce délai les signes de
l'épanchement devinrent plus positifs; il s'en
joignit quelques autres qu'il le firent connaître.



D'une manière péremptoire: Ces signes furent
1° l'amplitude du côté gauche de la poitrine
2° l'écartement de chaque partie antérieure des côtes,
qui parurent alors beaucoup plus éloignées les
unes des autres qu'elles ne le sont dans l'état
naturel, et 3° l'œdème et l'empatement du
même côté.

Enfin le 12 février vingt cinquième jour de la
blessure, on fit une dernière consultation où après
avoir reconnu unanimement l'existence d'un
épanchement, on décida pour en procurer l'évacua-
tion de faire dans le lieu d'élection une ponction
à la poitrine avec le troiscart. Le chirurgien
qui fit cette opération ayant retiré son
instrument, on fut singulièrement surpris de
ne rien voir sortir de l'intérieur de la poitrine
on retira la canule qui ne pouvoit être d'aucun
usage, on mit une compresse sur la petite
plaie que le troiscart avoit faite, et une

plaie

demie heure après le malade mourut.

Le juge informé de cet événement me commit de faire sur le champ en sa présence l'ouverture du cadavre, pour constater la cause de la mort. j'y appelai le chirurgien ordinaire et son beau-père qui avoit donné conjointement ses soins au blessé, afin qu'ils fussent présents aussi à cet examen.

Avant que le cadavre fut posé sur la table ou il devoit être ouvert je trouvai 1°. Que tout le côté gauche de la poitrine depuis le sternum jusques aux vertèbres du dos étoit œdématisé et empâté.

2°. Que la plaie qui avoit été faite par le coup d'épée étoit entièrement cicatrisée dans son extérieur; car à l'ouverture du cadavre je vis très distinctement que la division des muscles intercostaux et de la pleure, en cet endroit étoit encore béante.

à la poitrine

3°. Que la partie antérieure des côtes étoit fort élevée, que leurs extrémités sternales étoient fort écartées les unes des autres, ce qui donnoit au côté gauche de cette capacité, beaucoup plus d'étendue et de volume que n'en avoit le côté droit.

Lorsque j'eus posé le cadavre sur la table, je donnai un coup de scalpel entre deux côtes proche le sternum, il sortit aussi tôt de l'intérieur de la poitrine un flot d'eau sanguinolente très foncée en couleur, lequel continuant de couler, fournit une quantité de fluide qu'on évalua à environ cinq pintes.

Dès que le sang fut évacué j'ouvris le cadavre selon les règles ordinaires: je trouvai dans le fond de la capacité gauche de la poitrine et dans toute la partie qui environne l'épine, une quantité considérable de sang



plaie

coagulé dont leau que j'avois fait sortir paroissoit s'être séparée. En examinant avec attention le lieu ou le chirurgien avoit donné le coup de troiscart, et que j'ai dit être le lieu de l'opération ou se pratique ordinairement l'opération de l'empyème: je trouvais que l'intérieur en étoit occupé par la plus grande partie des caillots de sang que leur pesanteur spécifique y avoit porté, le blessé pendant le cours de sa maladie ayant toujours été couché sur le dos et un peu sur le côté de la blessure, excepté dans les instans où, pour chercher à reconnoître la présence de l'épanchement on le mettoit dans d'autres positions. Je reconnus aussi que le troiscart avoit été directement porté dans les caillots, dont le sang qui les formoit ayant perdu toute fluidité n'avoit pu couler dehors à la faveur de la canule.

Si la ponction eût été faite vers le milieu

à la poitrine

de la côte de la poitrine ou dans un endroit assez proche des cartilages des vraies côtes; il est évident qu'on eût évacué l'épanchement, la preuve en résulte de la facilité avec laquelle il est sorti lorsque j'y donnai le coup de scalpel: l'indication alors eût été mieux remplie: mais la fait prouve aussi qu'on n'eût évacué que la partie fereuse de l'épanchement, les caillots par leur densité et leur consistance n'auroient été par la suite que très difficilement délayés, et il auroit fallu employer bien des moyens pour y parvenir; D'ailleurs reste à savoir si l'on y eût réussi; et quand même la chose auroit pu se faire, je crois que, vu l'état où se trouvoit alors le poulmon gauche eût été fort en vain qu'on se fut promis l'esperance de sauver le malade.



plais

Ce poumon avoit éprouvé une telle compression de la part de cet énorme épanchement qu'il en étoit méconnoissable. Que l'on se représente un corps inégalement cylindrique moins gros que l'avant bras de l'enfant le plus maigre; rapproché intimement du médiastin, et serré fortement contre cette cloison membraneuse, caché sous le péricarde adhérent à celle et à la cloison du médiastin, enfin dur et très compact et l'on aura une idée de ce qu'étoit le poumon gauche dans cet état de compression extrême.

Le médiastin, le péricarde et le cœur avoient été poussés vers la capacité droite de la poitrine par la présence de l'épanchement. Le poumon droit quoique fort sain et sans adhérences avec la plèvre, se trouvoit aussi un peu serré dans la cavité qui le renferme; je le reconnus adhérent au péricarde et au

à la poitrine

médiastin dans une assez grande étendue; ces phénomènes me parurent être encore des effets de la présence de l'épanchement qui s'étoit fait place aux dépens de toutes ces parties.

Le péricarde ayant été ouvert je remarquai que le cœur, par la même cause, avoit aussi contracté des adhérences avec cette enveloppe; toutes les adhérences peu anciennes se détruisirent avec assez peu d'efforts lorsque je passai les doigts entre les parties qu'elles unissoient.

Je trouvais les viscères du bas ventre dans l'état naturel; il y avoit très peu d'eau épanchée dans cette capacité.



plaie

Reflexions.

Cet examen fini, je cherchai à découvrir de quel vaisseau rompu ou déchiré, le sang qui formoit l'épanchement avoit pu sortir; la confusion où se trouverent toutes les choses m'empêcha d'y rien démêler: Mais comme je ne trouvais aucune trace de lésion sur la surface du poulmon que j'examinai avec soin je presumai que cette effusion étoit venue de l'ouverture de quelques uns de ces rameaux artériels, qui viennent de la mammaire interne à la plevre et aux muscles intercostaux adjacens, pour s'anastomoser avec les ramifications des artères intercostales correspondantes; ou de quelques uns de ces rejettons de la même artère qui après avoir rampé entre les cartilages des côtes percent la parois de la poitrine

à la poitrine

pour aller se distribuer au muscle grand pectoral: la situation de la plaie favorisoit d'ailleurs, on ne peut mieux cette conjecture.

Quant à la manière dont cet épanchement s'est formé, il y a tout lieu de croire qu'il ne s'est formé que peu à peu, et qu'il n'est venu que d'une source très petite, puisqu'il ne s'est pas manifesté d'une manière évidente dans les premiers jours de la blessure, comme il le fait ordinairement quand il sort d'un tronc plus considérable. Cet épanchement gradué a comprimé le poulmon gauche aussi peu à peu pendant un laps de temps assez long sans donner des marques bien positives de son existence. Jusqu'à environ le vingtième jour le malade a pu se tenir quelques momens sur son flanc et s'est couché



plaie

sur le côté sain sans ressentir une grande oppression quoiqu'il se plaignit néanmoins d'un malaise assez pénible. Jusques là, l'amplitude de la poitrine, l'elevation et l'écartement des côtes ne se montrant pas encore, ne pouvoient en faire connoître intuitivement la présence; il n'est donc point étonnant que les chirurgiens chargés du soin du malade, n'ayent pas decidés de faire dans un temps moins reculé l'opération de l'empyeme, qui étoit pourtant alors le seul moyen de guérison qui convint d'employer, et ce moyen auroit d'autant mieux réussi que le malade étoit jeune, bien constitué et d'un bon tempérament.

Mais pourquoi au malaise et à l'oppression près, le malade a-t-il pu se coucher quelques moments pendant un certain temps sur le côté

à la poitrine

sain sans craindre d'être suffoque, contre ce qui arrive ordinairement dans les épanchemens de l'intérieur d'un des côtés de la poitrine? voici ma conjecture.

L'ouverture du vaisseau qui a produit l'épanchement s'étant trouvée fort petite, parce que le vaisseau avoit lui-même peu de volume, cet épanchement n'a dû se faire que peu à peu: la compression du poulmon gauche occasionnée par la présence du sang hors de ses vaisseaux — ainsi que la diminution de son volume, de même, ont dû aussi avoir des degrés. L'effusion de ce fluide n'ayant pas discontinué, l'épanchement a dû s'augmenter de plus en plus, la compression et la diminution du volume du poulmon s'en sont suivies dans la même proportion jusqu'à ce que ce viscere ait été réduit au petit volume ou je l'ai trouvé, et mis hors d'état de faire sa fonction.



plaie

pendant ce laps de temps, le malade s'est peu à peu accoutumé à ne plus respirer que du poumon droit, comme le font ceux, à qui la suppuration a totalement détruit l'un ou l'autre de ces organes. Or la diminution du volume du poumon s'étant trouvée proportionnelle à la quantité de l'épanchement, il s'en est suivi, que l'épanchement a rempli la côte gauche de la poitrine et ~~l'a~~ occupé la place du poumon qu'il avoit réduit. Jusques là le volume de cette capacité s'est trouvé à peu près le même, et tant que la quantité de l'épanchement n'a pas dépassé le volume du poumon, cette quantité pressant sur le médiastin dans le temps où le malade étoit couché sur le côté sain, elle n'agissoit pas ^{avec} assez d'intensité pour causer l'oppression considérable et l'espèce de suffocation dont se plaignent les blessés ~~en~~ ^{en} qui les épanchemens se sont faits avec rapidité après de pareilles

aloportine

blessures, par l'ouverture de vaisseaux de plus gros calibre, et où le sang conserve encore de la fluidité; elle ne causoit au contraire ici qu'une oppression médiocre et un malaise qui gémissoient seulement, mais ~~quant~~ le malade s'entretenoit avec d'autant moins de peine, que le poids de l'épanchement n'excedoit pas encore de beaucoup celui que le poumon doit avoir dans son état d'intégrité; et c'est l'absence d'un effet plus considérable et plus rapide qui a tenu les chirurgiens dans leur sécurité et qui les a éloignés de pratiquer l'opération de l'empyème.

Mais l'effusion du sang ayant continué de se faire, la quantité de l'épanchement s'est augmentée de plus en plus, la compression du poumon est devenue extrême, le sang par son séjour et par sa propre pression



plaie

sest coagulé et a laissé échapper la ferrosité
qui, par sa légèreté respective s'est trouvée
occuper la partie la plus élevée de la poitrine
considérant toujours le malade dans la
situation horizontale qu'il a gardé. Cette
capacité s'est étendue du côté de l'épanchement
pour lui faire place: les côtes se sont
élevées en conséquence et leurs cartilages se sont
écartés les uns des autres: la partie fereuse
du sang filtrée à travers les muscles intercostaux
est venue se déposer dans le tissu cellulaire
du thorax de la même côté, et y établis une
œdématis et un empyement considérable;
l'oppression s'est augmentée de plus en plus;
le malade n'a pu se tenir couché un seul
instant sur le côté opposé à la blessure
sans courir les risques d'être suffoqué: Enfin
les signes propres à faire connoître un épanchement,

à la poitrine

par leur réunion, n'ont plus laissé de doute
sur son existence, on s'est déterminé d'après
eux, de faire une ponction à la poitrine: mais
le coup porté dans un caillot de sang, n'a pu
être suivi de l'issue d'aucun fluide, et la
compression des parties destinées aux fonctions
vitales ayant été portée à son comble a
arrêté tous leurs mouvements et dès lors la
vie du malade a cessé.

Cette observation doit bien faire restreindre
la proposition trop générale établie par
quelques praticiens de ne jamais piquer les plaies
de poitrine lorsqu'on n'a pas des signes très
positifs de la présence d'un épanchement: Ce
précépte dont beaucoup de chirurgiens font
pénétrer peut quelque fois, en pareilles
circonstances les induire à négliger un secours



plage

tres salutaires: si l'usage de la sonde n'étoit
destiné qu'à faire connoître qu'une plaie
penetre ou non dans la capacité de la
poitrine, il seroit assez indifferent pour ne pas
dire inutile de s'en servir, parce qu'à l'aide des
signes rationels on peut en juger avec assez
de certitude; d'ailleurs il est fort peu important
de savoir si la plaie penetre ou non, puis-
que ce n'est jamais de cette pénétration que se
tirent les indications curatives. La sonde a
donc un usage plus intéressant, c'est celui de
favoriser la sortie d'un épanchement, pour
qu'on ait des indices qu'il en existe: en l'in-
troduisant par la plaie dans l'intérieur de la
poitrine on le dirige à son gré et on va
chercher le fluide qu'on amène au dehors, à sa
faveur et à celle de la situation convenable
qu'on donne au blessé: je ne dis pas qu'il



à la poitrine

faillie s'en servir dans tous les cas, mais je
crois aussi que c'est un abus de ne s'en servir
jamais: en effet, quel mal y auroit-il de sonder
une plaie de poitrine, lorsque par le malaise
l'oppression quoique légère, mais constante, la
difficulté de rester long temps couché sur le côté
opposé à la blessure, on auroit quelque lieu
de soupçonner un épanchement, surtout si ces
symptômes subsistent malgré les saignées
et les autres moyens curatifs? Quelle faute
commettrait un praticien qui dilateroit une
telle plaie pour faciliter l'usage de la sonde
dans le cas où elle se trouveroit trop étroite?
S'il y avoit un épanchement, ce seroit un moyen
efficace pour l'évacuer; s'il ne s'en trouvoit
point on refermeroit la plaie, et il n'en
résulteroit aucun accident. Je conviens
que de tels symptômes, seroient à la vérité des

plaie

indices bien legers pour se decider d'apres eux
a dilater les plaies de poitrine; je puis même
dire avoir observe plusieurs cas, ou ils se
confondent tres souvent avec les symptomes du
spasme qui accompagne quelque fois les fortes
de plaies, et qui se manifestent toujours avec
plus ou moins d'intensité dans leurs premiers tems;
mais j'ai aussi remarqué que les saignées,
les remedes generaux et les antispasmodiques
font cesser ces symptomes en fort peu de jours
quand ils sont purement spasmodiques; au lieu
que lorsqu'ils dependent de la presence d'un
epanchement qui n'est pas d'un fort gros
volume et qui n'occupe pas encore une place
assez considerable dans la capacite ou il a son
foyer pour donner lieu a de plus effrayans et de
plus decisifs, ils subsistent toujours malgré
l'usage des remedes que je viens de nommer, et

a la poitrine

tel fut le cas ou s'est trouve le malade dont
il s'agit: Cette remarque doit suffire a me
sembler pour se determiner a introduire le
sonde a poitrine et meme a dilater la
plaque si elle est necessaire pour y parvenir; j'en ai
ainsi use, dans quelques uns ou le panchement
etait equivocal et je m'en suis bien trouve.
Si l'on s'en fut tenu a ces seuls signes, qui
ont subsiste malgré les quatorze saignées, et
tous les remedes generaux jusqu'au vingtieme
jour, et qu'on eut procede de la maniere que
je viens de le dire a l'egard du malade qui
fait l'objet de ces reflexions, on auroit favorise
beaucoup plutot et dans le tems utile l'evacuation
de l'epanchement, on auroit mis ce blessé en garde
contre le venement le plus facheux, et en remplis-
sant par la plus directement les vues de l'art
on auroit pu lui sauver la vie.



II.

Observation

sur une plaie contuse à la tête avec dénudation d'une partie des os coronal et pariétal.

Un cocher de maison conduisant rapidement sa voiture à la descente d'une montagne tomba de son siège à terre, l'une des roues de la voiture lui ayant passé sur la tête en glissant sur les os du crâne, lui fit une plaie à lambeau de l'étendue de plus de sept travers de doigts.

Cette plaie qui commençoit à la partie moyenne du sourcil gauche qu'elle divisait, se continuoit en remontant sur la partie moyenne du coronal, divisait une portion des muscles frontal et crotaphite gauche et se terminoit à la partie supérieure et moyenne de l'os pariétal du même côté.

Le lambeau qui résultoit de cette blessure, étoit

à la tête



formé des teguments, d'une grande portion des muscles que je viens de nommer, et du péricrâne que le frottement de la roue contre les os avoit détachés. Ce lambeau tomboit sur la tempe proche l'oreille et l'arcade zygomatique, et par là, laissoit les os dénudés d'environ l'étendue de la paume de la main; il étoit non seulement très contus, mais encore tellement enfoncé dans son milieu par l'action compressive de la roue qui avoit passé dessus qu'il y avoit dans un point de son étendue un trou rond de plus de six lignes de diamètre; ce trou paroissant être l'effet de l'impression d'un corps fort inégal qui s'étoit rencontré en cet endroit, et que l'action de la roue avoit déterminée. Cette blessure arrivée dans la matinée ne fut examinée qu'à neuf heures du soir.

Je fus appelé à cette heure pour panser la

plaie

blessé: je trouvai non seulement la plaie dans l'état que je viens de désigner, mais j'observai encore que les os dénudés étoient fort secs, qu'ils étoient ainsi que la plaie couverts, et remplis de sables, de graviers et de sang coagulé et qu'un gonflement considérable affectoit déjà les parties extérieures de l'œil, les environs de l'oreille et de la joue.

M'étant assuré qu'il n'y avoit point de fracture au crâne, le blessé n'ayant aucun des symptômes qui caractérisent la commotion du cerveau, et conservant au contraire la connaissance et toutes les facultés animales et intellectuelles, la réunion du lambeau fut l'indication qui se présenta: et quoique la suppuration que l'on croit être inévitable des plaies contuses parut contre-indiquer les moyens que je me proposois d'employer pour maintenir les parties divisées dans une approximation nécessaire, la dénudation des os me détermina à prendre le parti de la réunion.

alutule

Pour y parvenir, après avoir coupé les cheveux, et rasé les environs de la plaie, je lavai l'intérieur ainsi que le lambeau avec du vin chaud; je la nettoyai des sables, graviers, caillots de sang et autres corps étrangers qui s'y étoient introduits: ensuite, je ramenai le lambeau de bas en haut, je l'étendis avec la paume de ma main, pour l'appliquer intimement sur les os dénudés afin de les recouvrir parfaitement, et je mis les lèvres de la plaie le plus de niveau qu'il me fut possible.

Quant au moyen de réunion: je desirois éviter de me priver de la future; mais considérant l'étendue de la plaie, la grandeur et la pesanteur du lambeau, la présence d'une suppuration qui, en s'établissant devoit tendre à écarter des os ou je voulois lui procurer de



plaie

nouvelles adhérences, le défaut de rectitude de la plaie; toutes ces choses furent autant de raisons qui me la firent préférer à tous les autres moyens de réunion que l'art fournit.

Je donnai l'exclusion à la future entrecoupée pour me servir de l'entortillée; je crus devoir choisir cette dernière, parce qu'assez ordinairement les fils de la future entrecoupée coupent très vite les chairs qu'ils traversent pour peu que le lambeau les tire ~~aille~~ par son poids; cet inconvénient qui ne laisse pas de retarder la réunion et même d'y nuire, et qui est beaucoup plus rare à la future entortillée, se voit arriver d'autant plus facilement dans le cas dont il s'agit, que le lambeau avait été singulièrement enfoncé par la pression vive de la cause qui l'avait détaché du crâne.

Je pratiquai donc cinq joints de future

à la tête

entortillée que je plaçai à des distances égales dans l'étendue de cette plaie. Je me servis pour cette opération des moyens qu'on emploie ordinairement dans celle du bec de lièvre, et je procédai de la même manière: par ces moyens les lèvres de la plaie se maintinrent très bien rapprochées depuis une extrémité jusqu'à l'autre: j'appliquai sur la base du lambeau des compresses graduées et expulsives dont l'effet étoit de soutenir le lambeau, de fortifier les joints de future, et de diriger les matières vers le haut de la plaie: Tout l'appareil fut soutenu du bandage appelé Capeline. Le malade fut saigné plusieurs fois et mis à un régime convenable.

À la levée de l'appareil que je ne fis que le troisième jour: j'observai que la suppuration s'établissoit dans toute l'étendue de la face



plaie

interne du lambeau: j'appliquai sur la plaie, ainsi que sur le trou accidentel dont j'ai parlé, des plumaceaux couverts de baume d'arceus, je trempai les compresses graduées dans un mélange d'eau vulnenaire spiritueuse et d'eau commune et j'assujettis le tout avec le même bandage.

L'effet des compresses et du bandage fait avec soin paroissoit devoir être suffisant pour procurer par la plaie, l'expulsion des matières purulentes à mesure qu'elles se formoient, mais bien qu'il en passât par cette division et par le trou accidentel du lambeau une assez bonne quantité il ne laissa pas de s'en accumuler encore beaucoup entre la base de ce lambeau et le crâne, ce qui établit en peu de temps un foyer assez considérable en cet endroit pour offrir de nouvelles indications à remplir.

Ce fut alors que les points de suture commencèrent à être tirillés, et que j'eus des craintes

à la tête

assez fondées de les avoir faits sans succès, malgré que je m'en promisse beaucoup. Pour éviter les inconvénients qui pouvoient résulter de ce tiraillement et pour procurer plus directement l'évacuation d'une matière qui, par sa présence ne pouvoit ~~qu'~~ empêcher le recroûtement du lambeau aux os dénudés, je résolus de faire une contre ouverture à la partie la plus declive de la base du lambeau au moyen de laquelle, le pus qui ent. une libre issue par cet endroit n'occasionna plus par sa présence le tiraillement des points de suture, qui eurent par la suite tous les effets que je pouvois désirer. Je continuai l'application du même bandage, et je pansai la plaie le plus rarement qu'il me fut possible.

Au bout de quelques jours les points de suture s'étant trouvés relâchés par la suppuration qui s'étoit établie dans les petites playes faites par les épingles dont je m'étois servi, leur application

plaie
devint alors d'autant plus inutile que le
lambeau étoit déjà assez adhérent aux os
pour se soutenir de lui-même : je les otai pour
ne me servir que du bandage unissant. peu
à peu la suppuration diminua, la cicatrice avança
et le malade fut entièrement guéri dans la
septième semaine de sa blessure.

Je dois faire observer que le traitement de
cette plaie n'a été traversé par aucun accident.
le malade n'a eu de fièvre dans les premiers
temps que ce qu'il en a fallu pour établir la
suppuration qui devoit dégorger les parties
contuses et favoriser l'adhérence du lambeau.
les saignées faites dans le temps utile, les remèdes
généraux, et surtout la confiance du malade
ont sans doute contribué à l'état de tranquillité
dont il a joui dans tout le cours de sa maladie.

à la tête

III.

Observation

Sur le même sujet



Une femme de marché dans un état
d'ivresse étoit assise sur le devant d'une voiture,
des chocs réitérés l'ayant fait tomber à terre
la roue lui froissa la tête et lui fit une plaie
à lambeau des plus considérables avec dénudation
d'une grande partie de l'os coronal et du pariétal
du côté gauche. L'accident arriva vers minuit
et je ne vis la malade que le lendemain sur les
neuf heures du matin.

Je trouvai cette femme ayant la tête enveloppée
d'un simple mouchoir, lequel couvroit une plaie
semilunaire et à lambeau de l'étendue de plus
de huit travers de doigts. Le péricrâne absolument

plaie

dechiré et détaché des os, étoit reuni à un lambeau de tegumens qui tomboit vers l'oreille, à la partie inférieure de l'os parietal. une grande portion de cet os et du coronal étoit demeurée dans une étendue presque aussi grande que la paume de la main, et la surface de ces os étoit sèche dans tous les endroits que l'air avoit touchés. Les muscles crotaphite et frontal gauche étoient lacerés dans une partie de leur étendue, et la plaie se trouvoit remplie de terre et de sang coagulé.

Après avoir coupé et rasé les cheveux des environs de la plaie et de la surface du lambeau et avoir reconnu qu'il n'y avoit aucune fracture au crâne, je lavai l'intérieur de cette plaie avec du vin chaud pour en ôter les corps étrangers: j'étendis le lambeau avec la paume de ma main et je le ramenai sur les os demeurés, au point d'affronter très parfaitement les lèvres, je fis soutenir le lambeau par un aide, pendant que j'appêtai les moyens dont je devois me servir pour en procurer la réunion.

à la tête

Je me déterminai promptement sur le choix de ces moyens: la lecture d'un savant mémoire sur l'abus des futures que l'Académie venoit de publier m'avoit un peu dégoûté de la pratique de cette opération, malgré différents succès que j'en avois obtenus dans le traitement de plusieurs plaies de diverses figures, et notamment dans le cas qui faisoit le sujet de l'observation précédente: Cependant, je n'avois trouvé dans ce mémoire, ou cette opération étoit absolument proscrite aucun cas qui ressemblât à celui dont il s'agit présentement ici; j'étois donc en quelque sorte, autorisé de recourir à la future et particulièrement à l'entortillée qui, depuis peu de temps m'avoit singulièrement réussi: néanmoins conduit par un guide aussi éclairé je crus devoir comme lui m'écarter de l'ancienne route et suivre le nouveau chemin que M. Pibrac venoit de tracer aux praticiens.

Pour le faire avec avantage, je taillai un



plaque

Morceau de forte toile, auquel je donnai la forme du lambeau dont je viens de parler, sans lui donner la même étendue: je fis à sa partie inférieure une section triangulaire dont on connaîtra l'usage dans un moment: je passai ensuite dans la portion convexe qui devoit être appliquée parallèlement à la lèvre inférieure de la plaie six fils assez forts et suffisamment cirés. Je coupai un autre morceau de la même toile, semi-lunairement, auquel je donnai plus d'étendue que la plaie n'avoit de longueur; je passai aussi six fils cirés dans son bord concave lequel devoit être placé parallèlement à la lèvre supérieure de la même plaie; je les chargeai tous deux d'emplâtre agglutinatif et après les avoir bien chauffés je les appliquai aux endroits de leur destination: j'observai de mettre un travers de doigt de distance entre l'emplâtre qui occupoit la partie supérieure de la tête et qui étoit

alalète

parallèle à la lèvre supérieure de la plaie et un peu moins à celle qui couvroit le lambeau. Les fils se trouvant bien vis à vis les uns des autres je les nouai ensemble par un nœud simple et une rosette.

prévenu que la suppuration pourroit peut-être se faire assez abondamment dans la face interne du lambeau, ou les chairs auroient été machées, et se placer entre lui et le crâne pour former vers sa base une collection de matières, qui, par leur séjour tendroient à éloigner les lèvres de la plaie et à empêcher ou tout au moins retarder sa consolidation, je crus devoir éviter cet inconvénient en faisant d'avance une contre-ouverture à la partie la plus basse du lambeau, précisément entre les deux côtés de la section triangulaire que j'avois pratiquée à cet effet à l'emplâtre agglutinatif destiné à couvrir le lambeau. Cette contre-ouverture dont l'usage étoit de donner issue aux matières à mesure qu'elles devoient se former, fut d'abord tenue ouverte par un dilatant.



plaie

Je couvris ensuite la plaie de petits plumaceaux étroits chargés de baume d'arceus : j'appliquai des compresses graduées et trempées dans leau vulnèraire coupée deau commune, par lemplâtre qui couvrait le lambeau, j'en mis une autre sur toute la plaie, et avec une longue bande roulée à deux globes, et fendue dans son milieu pour passer l'un des globes afin de donner plus de fermeté, je fis un bandage unissant dont les circlaires soutinrent on ne peut mieux l'effet des emplâtres agglutinatives et favorisèrent la réunion du lambeau.

Je saignai plusieurs fois la malade, je lui prescrivis un régime qu'elle n'observa pas trop rigoureusement mais dont le vice n'apporta pourtant aucun dérangement aux vues de la nature et de l'art dans le traitement de cette blessure.

La suppuration s'établit sous le lambeau —

alatele

Comme je l'avois prévu et les matières coulerent si bien par la contreouverture dont elles suivirent la pente qu'il n'en sortit presque point par la plaie. Je pansai cette plaie très rarement, et elle fut entièrement fermée et cicatrisée en six semaines de tems au plus, sans accidens quelconques : la contreouverture se ferma aussi très peu de tems après la plaie et le lambeau demeura constamment adhérent et collé aux os du crâne qui avoient été dénués.

Reflexions.

On a dit que les os dénués depuis quelques tems, exposés à l'air ambiant et desséchés, par ce fluide s'exfolioient toujours, et que les chairs ne contractoient d'adhérences qu'avec les boutons charnus qui naissent de la substance délos après avoir subi l'exfoliation. on a prétendu encore que l'exfoliation d'un os ne se faisoit pas toujours —



plaies

sensiblement lorsqu'il avoit été decouvert, que les portions qui s'en detachioient étoient quelque fois si petites qu'elles se déroboient à la vue des observateurs les plus attentifs. Je me suis beaucoup attaché à reconnoître pendant le traitement des deux plaies que je viens de décrire si dans la matière qui en decouloit il ne se seroit pas trouvée quelques parcelles d'os: je puis affirmer malgré mes attentions à observer, n'en avoir rencontré d'aucunes espèces: j'ai traité des plaies avec dénudation d'os ou il se faisoit des exfoliations insensibles, c'est à dire ou l'on ne trouvoit aucunes parcelles d'os sensibles au toucher, mais la couleur noire du pus qui decouloit de ces plaies et qui teignoit les plumaceaux decouloit suffisamment l'existence d'une exfoliation. Je n'ai rien observé de semblable dans les deux cas que je viens de rapporter, le pus qui sortoit tant par les plaies que par les contre ouvertures, s'est toujours trouvé très blanc et bien conditionné,

à la tête

D'ailleurs s'il s'étoit fait quelques exfoliations il auroit fallu pour parvenir à une parfaite guérison un temps beaucoup plus considérable que la nature n'en a mis à consolider ces deux plaies: Je suis donc en droit d'en conclure que dans ces deux cas il ne s'en est faite d'aucune espèce et quoique les os decouverts ayent été touchés par l'air le space de dix à douze heures, ce n'a point été une raison pour qu'il se soit détaché quelques portions de leur surface ni pour empêcher le recollément et l'adhérence du lambeau à ces memes os.

Ces observations donnent aussi la preuve qu'en pareilles circonstances, la contre ouverture se fait avec utilité. Dans le fait de la première observation elle a été nécessitée par la présence d'une grande quantité de matières dont la collection placée sous la base du lambeau l'éloignoit de la surface du crâne ou il étoit important de le fixer, l'empêchoit d'y



glaie

prendre les adhérences desirables, rendoit les points de suture inutiles en les tirillant continuellement occasionnoit l'écartement des lèvres de la glaie et opposoit à sa consolidation, ce qui ne pouvoit que retarder considérablement la cure. Dans le sujet de la seconde, la contre ouverture faite dans les premiers temps a prevenu tous ces inconveniens, elle a rendu dans cette glaie, la suture absolument inutile, puisque l'agglutination et le bandage unissant ont suffi pour en procurer et même en accélérer la reunion: le bandage unissant auroit peut être été lui même suffisant pour favoriser cette reunion privativement à tout autre moyen si on n'avoit pas été obligé de le defaire de temps en temps pour ôter les matieres et nettoyer la glaie et si l'on n'avoit pas craint que le poids de

à la tête

lambeau, à la levée de chaque appareil n'en eût éloigné les lèvres l'une de l'autre: c'est cette dernière considération que je fais avant que de poser le premier appareil qui me détermina à alier ces deux moyens qui me paroissent nécessaires pour procurer à la glaie une plus prompte et plus sûre reunion.

La seconde de ces deux observations prouve encore que les grandes glaies des tegumens de la tête avec lambeau, compliquées du déchirement des parties musculaires et du pericrane, et avec dénudation des os du crâne dans une assez grande étendue, peuvent, comme dans les autres parties du corps, se réunir sans le secours des sutures que l'on a toujours mis en pratique avec une grande confiance: Cette même observation peut servir à confirmer les assertions et l'excellente doctrine du savant auteur du mémoire sur l'abus des sutures, que j'ai cité plus haut. /



IV.

Observation.

sur une plaie considérable située sur
les vertèbres des lombes et l'os sacrum.

Le 24 septembre 1765 on vint me
chercher pour secourir l'enfant du *si*. Doublet
musicien du Roi, qui venoit de se faire une plaie
considérable sur les vertèbres des lombes et sur
l'os sacrum.

Cet enfant âgé de six ans et convalescent
de la petite verole, ayant besoin de rendre
ses excréments fut mis à cet effet, par sa garde
sur un pot de chambre de fayance qui se
trouva fêlé : le poids du corps de l'enfant
qui étoit assis immédiatement dessus, fit crouler
le vase, et l'enfant étant tombé ~~incontinent~~

aux lombes

glissant dessus, un fragment très aigu et fort tranchant, lui coupa et déchira les tegumens et toutes les chairs qui se trouverent a sa rencontre, et lui fit une plaie qui s'étendoit depuis environ trois travers de doigt au dessus de l'anus jusqu'à la hauteur de l'épine de la troisième vertebre des lombes.

Cette plaie qui pénétrait jusques sur l'os sacrum, et jusqu'à l'origine des apophyses transverses et épineuses des vertebres des lombes, étoit parallèle a ces dernières apophyses, elle faisoit connoître que le fragment qui l'avoit fait avoit dilacéré en même temps les tegumens, les portions tendineuses des muscles grand dorsal, sacrolombaire, et très long du dos qui, en cet endroit couvrent le muscle sacré: Ce dernier muscle étoit aussi



plaie

divisée en deux dans la partie la plus —
proche de l'os sacrum, et laissoit voir par
cette division, la partie supérieure de ce
même os. La plaie étoit au côté ~~gauche~~
gauche de la colonne vertébrale.

On concevoit par cet exposé, que cette plaie
se trouvoit être de la classe des contuses et
dechirées, puisque le fragment de sangle —
qui l'avoit faite, ne presentoit qu'un tran-
chant fort inégal et par là très propre à
contondre et à déchirer les chairs: elle étoit
donc de l'espèce de celles que les auteurs
conseillent de faire supputer avant que
de les réunir. Néanmoins fondé sur diverses
expériences et sur plusieurs faits qui —
demonstrent intuitivement, qu'on peut procurer
même assez promptement la réunion de —
certaines plaies contuses, sans qu'il soit —

aux lombs

nécessaire d'attendre plus long temps le
degorgement des chairs dilacérées, je crus
devoir déroger à ces règles surannées et tenter
de reunir celle-ci le plus promptement qu'il
me feroit possible.

Pour remplir avec fruit cette indication
je ne vis d'autres moyens à employer que le
bandage unissant: mais comme la plaie se
trouvoit enfoncée entre les deux globes des
fesses qui, dans cet enfant étoient assez
proéminens, je presurai que les tours de
bande, surtout dans la partie inférieure de
la plaie, ne portant pas sur les lèvres ne
soutiendroient qu'imparfaitement à leur écartement.
Pour parer à cet inconvénient, je préparai
deux compresses languettes fort épaisses dans
toute leur étendue, mais que je rendis plus
épaisses dans les endroits qui devoient remplir



plaie

les enfoncements, et a cela près je leur donnai — une forme assez semblable aux compresses — languettes qu'on fait puyées aux attelles dans les fractures des grandes extrémités. Je trempai ces compresses jusqu'à parfaite imbibition dans un mélange de blanc d'œuf d'eau de vie et d'eau commune bien batue et mêlée ensemble, je coupai une bande a laquelle je donnai une longueur suffisante et je la roulai en un globe : je préparai encore quelques autres pièces pour compléter mon appareil.

Cela fait je fis coucher l'enfant sur le ventre, je nettoyai la plaie et lavai son intérieur avec du vin chaud pour enlever le sang coagulé et plusieurs petits fragmens de foyance qui y étoient restés, et lorsque j'en eus rapproché les lèvres et que je les eus mises exactement de niveau, j'appliquai les deux

aux lombes

Compressees languettes sur les bords de la plaie et parallelement a ses levres observant de mettre leurs portions les plus epaisses dans les enfoncemens afin de les remplir, et observant encore de les faire depasser un peu les extremités.

Mon intention dans ce procede' etoit, que les languettes venant a prendre quelque consistance par l'evaporation du blanc d'aent, elles se moulassent et comprimaient dans la plus grande exactitude les bords de cette plaie et en tintent toujours par la les levres intimement rapprochées.

Je mis sur ces premieres d'autres compressees epaisses trempées dans le même defensif, jusqu'à ce que le niveau de la peau de la partie superieure des fesses en fut deffait: je fis ensuite autour du corps un bandage



plaie

circulaire dont l'effet étoit de soutenir les
compresses languettes et de les tenir en leurs
places en même temps qu'il fortifioit leur
action: je donnai ensuite à l'enfant dans
son lit la situation la plus convenable et
la plus propre à remplir l'objet que je
m'étois proposé.

Je laissai cet appareil six jours de suite
sans y toucher; je me contentai de l'arroser
deux fois par jour avec une infusion de
fleurs de melilot, de serreau et de milpertuis
aiguisée d'un peu d'eau vulnèraire spirituelle
tant pour prévenir l'inflammation toujours
disposée à se manifester dans les plaies faites
par des instrumens contondans et déchirans,
et surtout dans celles où quelques parties
tendineuses et agonesrotiques se trouvent lacerées.

Plaie

Ces matieres qui expriment les chain divisees
ne sont que des fucs gelatineux plus
propres a favoriser leur consolidation qu'a
ly opposer: et quoique celle qui fait l'objet
de ces reflexions ait du a bon titre etre
regardée comme une plaie contuse, il n'est
pourtant sorti de son interieur, d'autre le
humour que la lymphe gelatineuse dont
je viens de parler.

Cette observation prouve encore que
cest une erreur de croire que pour parvenir
à la parfaite consolidation des plaies
contuses, il soit toujours necessaire de
les faire suppurer, et qu'a cet effet
on doive les panser souvent et mettre
dessus des digestifs ou autres onguents;
l'experience des praticiens fait voir au

aux lombes

contraire que dans un grand nombre de
cas ces moyens sont plus capables d'en
éloigner la guérison que de l'accélérer. /

à Versailles }
le 20 juin
1770 }

par Mariques Lieutenant
de M^r. Le premier chirurgien du Roi
à Versailles : et Correspondant de
l'Académie Royale de Chirurgie



aux lombes

que pour empêcher la trop grande exication
des compresses dont l'endurcissement et la
compacité trop considérables auroient pu
avec le tems contondre les lèvres de la plaie
et exciter de la douleur, qu'il est toujours très
important de prévenir dans quelque cas que
ce soit.

L'appareil ayant été levé ~~pour la~~
première fois le sixième jour de son
application, j'aperçus la réunion des lèvres
de la plaie déjà faite, il n'y restoit plus
qu'une ligne peu étendue à cicatriser : —
j'appliquai sur cette ligne une petite emplâtre
fort étroite, de baume d'orcenus, et je remis
le même appareil que je ne levai que trois
jours après : alors plus des trois quarts de
la ligne dont je viens de parler se trouvant



plaie
parfaitement cicatrisée. une petite
emplâtre dessicative, mise sur le reste de
cette ligne acheva de la cicatriser en trois
autres jours.

Reflexions.

On voit par cet exposé que la plaie
dont il s'agit, capable de stryper, tant par
son étendue que par la nature des parties
lées, des chirurgiens peu expérimentés, ne
fut regardée de ma part que comme une
plaie très simple; le procédé aussi simple
auquel j'eus recours pour en procurer la
réunion prouve, qu'en pareil cas, il n'en est
pas de meilleurs que ceux qui, sans trop
incommoder les malades maintiennent les
lèvres des plaies exactement rapprochées; rien
ne remplit donc mieux cette indication que

aux lombes

les bandages unissants quand la situation et la figure des plaies en permet l'application. Je me suis comporté dans le traitement de celle-ci (à laquelle comme on a pu voir je n'ai fait que trois pansements) comme on le fait ordinairement dans le traitement des fractures simples; j'ai évité autant qu'il m'a été possible la levée trop fréquente de l'appareil persuadé que quand il n'y a a point de raisons pressantes de découvrir une plaie, c'est lui faire tort et retarder sa guérison, que d'ôter souvent un bandage et un appareil, dont l'application constante retient les lèvres intimement rapprochées. On ne doit point, pour s'autoriser à lever fréquemment les appareils, alléguer la nécessité de nettoyer les matières qui sortent des plaies, surtout lorsqu'elles sont peu abondantes.



